

DIFURE[®] solo

Novinka

FUNGICID PRO KONTROLU LISTOVÝCH CHOROB CUKROVKY

- ▶ Systémový účinek
- ▶ Preventivní a kurativní účinek
- ▶ Pohybuje se translaminárně a akropetálně (ochrana nových přírůstků)
- ▶ Krátká ochranná lhůta

Detaily produktu

Účinná látka

difenokonazol 250 g/l

Formulace

emulgovatelný koncentrát (EC)

Difure Solo obsahuje účinnou látku difenokonazol patří do skupiny triazolů, zastavuje patogen inhibicí syntézy ergosterolu v buněčných membránách (DMI). Vykazuje preventivní a kurativní účinnost. V rostlině se pohybuje translaminárně a akropetálně. Má velmi silný systémový účinek, díky němu dochází i k ochraně nových přírůstků.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
cukrovka, řepa krmná	rez řepná	0,5 l/ha	21	od: 39 BBCH

Max. počet aplikací v plodině 2x. Interval mezi aplikacemi 14 dnů.

Doporučení pro aplikaci :

- z důvodu zvýšení účinnosti a antirezistentní strategie neaplikujte přípravek Difure Solo samostatně, ale vždy v kombinaci s dalším přípravkem
- optimální teplota pro aplikaci je nad 12°C
- široké spektrum účinku – padlí, cercosporióza, rez
- přípravek je možné použít pro aplikaci v termínech T1, T2, i T3.
- doporučené kombinace:
 - Difure Solo 0,4 l/ha + Bagani (tetrakonazol) 0,6-0,8 l/ha
 - Difure Solo 0,4 l/ha + Topsin M 500 SC (thiophanate methyl) 0,5-0,7 l/ha
 - Difure Solo 0,4 l/ha + Flosul (síra) 3-5 l/ha
 - Difure Solo je možné mísit s hnojivy na bázi mědi i s insekticidním přípravkem Teppeki proti mšicím.

