



## VYSTŘELTE PLEVELE Z KUKUŘICE

- ▶ Nejlepší poměr cena výkon na trhu
- ▶ Antirezistentní strategie
- ▶ Rychlý účinek (7-10 dní)
- ▶ Selektivita ke kukuřici
- ▶ Flexibilní termín aplikace
- ▶ Booster efekt

### Detaily produktu

#### Účinná látka

**pyridát 300 g/l; mesotrion 90 g/l**

#### Formulace

**olejová disperze (OD)**

Onyx Extra obsahuje dvě účinné látky s různým mechanismem účinku. Pyridát je přijímán listy a působí kontaktně a velmi rychle, mesotrion pak je přijímán hlavně hypokotylem a kořeny, zajišťuje reziduální působení. Navíc kombinace těchto látek vyvolává tzv. „Booster efekt“ kdy látky se vzájemně podporují a zvyšují svoji účinnost. Tento efekt můžeme vyjádřit i matematicky, kdy  $1+1$  se nerovná  $2$ , ale  $3$ . Z důvodu, že neobsahuje ALS inhibitory (sulfonylmočoviny) ani terbuthylazin jsou vhodným antirezistentním řešením proti plevelům v kukuřici. Onyx Extra navazuje na oblíbený balíček Onyx + Temsa, oproti tomu to balíčku je o 20% navýšen obsahu mesotriionu při zachování stejné dávky pyridátu.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
kukuřice	plevelejednoděložnéjednoleté, plevelevouděložnéjednoleté	1 l /ha	AT	Kukuřice od: 12 BBCH, do: 18 BBCH Plevele od 09 BBCH, do: 14 BBCH
		0, 5 l/ha (aplikace opakovaná do celkové dávky 1 l/ha)		

Název plevelu	Onyx Extra 1 l/ha
mračňák Theophrastův	
laskavec žmíndovitý	
laskavec srstnatý	
ambrozie peřenolistá	
drchnička rolní	
lebeda	
řepka výdrol	
kokoška pastuší tobolka	
chrpa modrá	
merlík bílý	
pcháč oset	
durman obecný	
zemědým lékařský	
svízel přítula	
pětour malokvětý	
pětour srstnatý	
kakosty	
kakost maličký	
ibísek trojdílný	
heřmánek pravý	
heřmánkovec nevonný	
bažanka roční	
pomněnka rolní	
mák vlčí	
rdesno ptačí	
opletka obecná	

Název plevelu	Onyx Extra 1 l/ha
rdesno blešník	
rdesno červivec	
šrucha zelná	
lilek černý	
mléč zelinný	
čistec rolní	
ptačinec	
penízek rolní	
rozrazil břechtanolistý	
rozrazil perský	
violka rolní	
řepeňdurkoman	
oves hluchý	
psárka polní	
pýr plazivý	
rosička krvavá	
ježatka kuří noha	
proso seté	
lipnice roční	
bér sivý	
bér zelený	
šáchor jedlý	

■ > 95 %  
 ■ > 85-95 %  
 ■ > 75-85 %  
 ■ > 65-75 %  
 ■ < 65 %

### Doporučení pro aplikaci :

- optimální termín aplikace 3-4 listy kukuřice v době kdy jsou plevelu nepřerostlé
- při výskytu ježatky větší jak 3.listy nebo pýru přidejte uč. látku nicosulfuron (Samson Extra, Fomet Extra)
  - Onyx Extra 0,8 l/ha + Fomet Extra (Samson Extra) 0,4-0,5 l/ha
- flexibilní termín aplikace umožňuje použít Onyx Extra i na C-post ošetření (2-3 list), zde doporučujeme zesílit reziduální působení přidáním přípravků s úč. látkou s-metolachlor (Dual Gold, Efica), pethoxamid či Dimethenamid-P
  - Onyx Extra 0,8 l/ha + Dual Gold (Efica) 0,8-1 l/ha
- Onyx Extra je vysoce selektivní je možné ho použít na kukuřici na siláž, na zrno, na osivo