

TESON[®]

DLOUHODOBĚ ÚČINNÝ A FLEXIBILNÍ FUNGICID

- ▶ Preventivní i kurativní účinek
- ▶ Ideální partner pro TM s jinými fungicidy z důvodu :
 - Zajištění antirezistentní strategie
 - Zvýšení účinnosti proti specifickým chorobám – kupř. rzi, padlí, braničnatky a skvrnitosti s přípravkem SPIKE (epoxiconazole)
- ▶ Dlouhodobý účinek
- ▶ V ozimé řepce vykazuje významný vedlejší růstově-regulační efekt
- ▶ Flexibilní použití

Detaily produktu

Účinná látka

tebukonazol 250 g/l

Formulace

emulze typu olej ve vodě (EW)

TESON je systémově působící přípravek s vynikající preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru hospodářsky významných houbových chorob v řepce a obilninách (ječmen, pšenice). Přípravek TESON se vyznačuje dlouhodobou účinností vůči houbovým patogenům.

V řepce mimo účinku na houbové choroby jako jsou fómová hniloba, čern řepková, bílá hniloba, můžeme sledovat i vedlejší účinky na *Cylindrosporium concentricum* a jiné choroby. Zároveň vykazuje i růstově stimulační efekt na rostliny řepky, který po podzimním ošetření snižuje poškození porostů vyzimováním a po jarní aplikaci odolnost rostlin proti poléhání.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL
řepka olejka	fomová hniloba brukvovitých	1 l/ha	56
řepka olejka	čern řepková, hlízenka obecná	1 l/ha	56
ječmen	fuzariózy klasů	0,75 - 1 l/ha	35
pšenice ozimá	fuzariózy klasů	1 l/ha	35

Přípravek se aplikuje v obilninách max. 1 x a v řepce olejce max.2 x.Přípravek v řepce olejce vykazuje významný vedlejší růstové-regulační efekt.

Použití v řepce olejce :

- proti fomové hnilobě
 - podzimní aplikace – v BBCH 14-19
 - jarní aplikace - v BBCH 30-59 – nejlépe od nástupu vegetace do fáze objevení se vrcholového pupenu
- proti hlízence obecné a černi řepkové : aplikace ve fázi BBCH 60-65, možné kombinovat s účinnou látkou isofetamid: Teson 0,6 l /ha + 0,4 l / ha Kenja
- k regulaci růstu na podzim
 - ideálně v termínu 4-5 listů řepky v dávce 0,5 l/ha, na každý další list řepky je potřeba navýšit dávku o 0,1 l/ha až na max. 1 l/ha

Použití v pšenici ozimé a ječmeni : proti fuzariózám klasů se aplikuje ve fázi BBCH 61-69

Doporučení pro aplikaci :

- aplikujte nejlépe na počátku výskytu choroby
- aplikujte ve 200-400 l vody/ha
- ekonomické varianty pro :
 - pšenice : aplikujte společně s přípravkem SPIKE (125 g epoxiconazole) v TM :
TESON 0,5 l/ha + SPIKE 0,5 l/ha
- TM zajišťuje účinnost na všechny choroby pšenice včetně rží
- Ideálně pro T2-T3 od objevení se klasu
 - ječmen jarní : aplikujte s přípravkem SPIKE (125 g epoxiconazole) v TM :
TESON 0,6 l/ha + SPIKE 0,6 l/ha
- TM zajišťuje spolehlivý účinek i na hnědou a ramuláriovou skvrnitost
- Ideální aplikace pro T2-T3
- podle potřeby možno aplikovat v TM s dalšími přípravky na bázi triazolů, morfolinů i strobilurinů

