

TORSO



Z PLEVELŮ ZBYDE JEN TORZO

- ▶ Obsahuje 3 účinné látky vzájemně se doplňující
- ▶ Účinek i na jedno i dvouděložné plevely
- ▶ Flexibilní dávkování
- ▶ Dlouhodobé působení
- ▶ Vedlejší účinek na výdrol obilovin

Detaily produktu

Účinná látka

**metazachlor 214 g/l + chinmerak 71 g/l
+ napropamid 206 g/l**

Formulace

suspensní koncentrát (SC)

TORSO je herbicid určený k hubení jednoletých jedno i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky ozimé. Je přijímán především prostřednictvím kořenů při vzházení. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčovými plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách. Podle současných poznatků je TORSO dobře snášen všemi odrůdami řepky včetně tzv. dvounulových. Torso obsahuje tři účinné látky, které se svým působením vzájemně doplňují.



Rozsah povoleného použití

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
řepka olejka ozimé	plevele dvouděložné, plevele lipnicovité jednoleté	3,5	AT	Preemergentně, max. 1x

Pro dobrý herbicidní účinek je nezbytně nutná kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou strukturou. Příliš kypré či hrudovité půdy je třeba uválet. Ošetření na kamenitých nebo hrudovitých půdách může být úspěšné pouze částečně, neboť semena plevelů klíčí zpod hrud nebo kamenů, aniž by se dostala do styku s herbicidem. Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je třeba dodržet hloubku seti 1,5-2 cm a semena řepky musí být zakryta dostatečnou vrstvou drobtovité zeminy. Účinnost může být poněkud zbržděna při přesušení povrchové vrstvy půdy.

	TORSO
Béry	Dark Green
Bažanka roční	Orange
Heřmánkovec	Dark Green
Heřmánky	Dark Green
Hluchavka nachová	Dark Green
Hulevník lékařský	Orange
Chundelka metlice	Dark Green
Ježatka kuří noha	Dark Green
Kakost	Yellow
Kokoška pastušší tobolka	Dark Green
Konopice rolní	Light Green
Laskavec ohnutý	Dark Green
Lílek černý	Dark Green
Lipnice roční	Dark Green
Mák vlčí	Dark Green
Merlík bílý	Yellow
Mléč zelinný	Dark Green
Obiloviny - výdrol	Orange
Opletka obecná	Light Green
Penízek rolní	Yellow
Petoury	Dark Green
Pcháč oset	Red

	TORSO
Pryšce	Yellow
Psárka rolní	Dark Green
Ptačinec žabinec	Dark Green
Rdesna	Light Green
Rosička krvavá	Light Green
Rozrazilý	Dark Green
Ředkev ohnice	Light Green
Starček obecný	Dark Green
Svízel přítula	Dark Green
Úhorník	Light Green
Violka rolní	Orange
Zemědým lékařský	Orange

Doporučení pro aplikaci :

- dostatek srážek po aplikaci zvyšuje účinnost
- aplikujte na pozemek bez větších hrud a kamenů
- doporučená dávka 3 l/ha
- při dostatku srážek lze dávku snížit na 2,5 l/ha, vyšší dávku 3,5 l/ha aplikujte při horší vláhových podmínkách a při potřebě zvýšení účinnosti na zemědým lékařský.
- nevykazuje fytoxicitu na řepku ani při pozdějších aplikacích

■ > 95 %
 ■ > 85-95 %
 ■ > 75-85 %
 ■ > 65-75 %
 ■ < 65 %